
Suprasorb® A
Penso de alginato de cálcio





A o excesso de exsudato da ferida é absorvido pelo penso
B formação de gel por troca iónica

Áreas de aplicação
Para o tratamento de feridas não infetadas, quando estas apresentam uma exsudação moderada a forte e são superficiais ou profundas.
Indicações:
- úlceras arteriais
- úlceras venosas
- úlceras diabéticas
- locais doadores de enxerto de pele de espessura parcial
- lesões por pressão

Fases de cicatrização da ferida:
- fase de exsudação
- fase de granulação

Características
- elevado conforto graças à estrutura particularmente macia e fácil tamponamento
- promove a cicatrização da ferida graças à elevada capacidade de absorção de exsudato
- adapta-se a qualquer leito de ferida
- ligação de bactérias e resíduos celulares no gel
- criação de um meio húmido da ferida

Composição do produto
fibra de alginato de cálcio

Notas
Intervalo de mudança de penso:
- é determinado pelo médico assistente, consoante o estado da ferida, o grau de exsudato e o penso secundário, devendo ser substituído o mais tardar ao fim de 5-7 dias

Nota em caso de infeção:
- penso secundário oclusivo apenas após decisão do médico, consoante a situação geral

Versões
- penso
- tamponamento

Suprasorb® A
estéril, selado individualmente

Dimensões (cm)	REF	SC/TC (unidade)
penso		
5 x 5	148147	10/240
10 x 10	148148	10/240
10 x 20	148149	10/70
tamponamento		
30 x 2	148150	5/50